Seringue

Quand vous sélectionnez cet instrument, un ou plusieurs flacons apparaissent en bas de l'écran. Une injection est un processus en deux étapes : vous devez d'abord aspirer la solution dans la seringue, puis l'administrer.



Aspirer la solution : après avoir sélectionné la seringue, positionnez le stylet sur le flacon approprié et faites-le glisser vers le haut pour aspirer la solution. Vous pouvez continuer jusqu'à ce que la seringue soit pleine.



Administrer la solution : placez le stylet à l'endroit où vous souhaitez effectuer l'injection. Tant que vous maintenez le stylet en contact avec l'écran, la solution continuera à être injectée et ce, jusqu'à ce que la seringue soit vide. Si vous levez le stylet avant que la seringue soit vide, vous pourrez administrer la quantité de liquide restant à un autre endroit.

Pansement



Au terme d'une opération, il est nécessaire de bander l'incision suturée. Après avoir appliqué le gel antibiotique pour stopper l'hémorragie, sélectionnez le pansement situé dans la zone inférieure droite. Placez ensuite le stylet sur une extrémité de l'incision et faites-le glisser jusqu'à l'autre extrémité de l'incision. Levez le stylet pour appliquer le pansement. Vérifiez qu'il n'est ni trop court, ni trop long et qu'il centré au-dessus de l'incision.

Fibrillation

Certains patients peuvent faire un arrêt cardiaque. Pendant la fibrillation, la barre des signes vitaux devient rouge et la ligne de l'ECG s'affole. En pareil cas, vous devez interrompre la procédure jusqu'à ce que le cœur reprenne un rythme normal ou s'arrête de battre. Si le cœur du patient s'arrête, il existe deux méthodes pour le ranimer :

Le défibrillateur

Si un patient fait un arrêt cardiaque dans des circonstances normales, le défibrillateur apparaîtra automatiquement. L'utilisation du défibrillateur s'effectue en deux étapes :



1. Placez le stylet sur l'une des palettes et faites-le glisser vers le milieu du patient. L'autre palette suit automatiquement.



2. Une fois les palettes en place, le voltmètre apparaît. Placez le stylet sur l'écran tactile. Quand le voltmètre atteint le niveau approprié (désigné par une petite zone verte sur le compteur), levez le stylet. Si la charge est trop faible ou trop forte, le cœur du patient risque de ne pas répondre.

Massage cardiaque

Si le défibrillateur n'est pas disponible ou ne peut pas être utilisé, vous devrez effectuer un massage cardiaque. Observez les contours des anneaux et lorsqu'ils se chevauchent, touchez le centre des anneaux avec le stylet. Vous devrez répéter cette opération plusieurs fois.